

Novel amphiphilic nucleic acid conjugates

Patent Number: ☐ US4904582
Publication date: 1990-02-27
Inventor(s): TULLIS RICHARD H (US)
Applicant(s): SYNTHETIC GENETICS (US)
Requested Patent: JP3500530T
Application Number: US19870061874 19870611
Priority Number(s): US19870061874 19870611
IPC Classification: C07H15/12; C12Q1/68; G01N33/566
EC Classification: A61K47/48H4P, C07H21/00F
Equivalents: ☐ EP0321548 (WO8809810), ☐ WO8809810

Abstract

Novel oligonucleotide conjugates are provided, where oligonucleotides are joined through a linking arm to a hydrophobic moiety. The resulting conjugates are more efficient in membrane transport, so as to be capable of crossing the membrane and effectively modulating a transcriptional system. In this way, the compositions can be used in vitro and in vivo, for studying cellular processes, protecting mammalian hosts from pathogens, and the like.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑬ 公表 平成3年(1991)2月7日

⑭ Int. Cl.⁹ 識別記号 庁内整理番号 審査請求 未請求
C 07 H 21/04 Z 7822-4C 予備審査請求 未請求 部門(区分) 3(2)
8717-4B C 12 N 15/00 A
6807-4B 5/00 B※

(全 15 頁)

⑯ 発明の名称 新規な両親媒性核酸接合体

⑰ 特 願 昭63-505633

⑱ 翻訳文提出日 平1(1989)2月13日

⑲ 出 願 昭63(1988)6月11日

⑳ 国際出願 PCT/US88/02009

㉑ 国際公開番号 WO88/09810

㉒ 国際公開日 昭63(1988)12月15日

優先権主張 ㉓ 1987年6月11日 ㉔ 米国(US) ㉕ 061,874

⑳ 発 明 者 テューリス, リチャード エイ アメリカ合衆国, カリフォルニア 92024, リューカディア, サク
ソニー ストリート 1320

㉑ 出 願 人 シンセティック ジエネティク アメリカ合衆国, カリフォルニア 92121, サンディエゴ, スー
ース イー, ローゼル ストリート 10457

㉒ 代 理 人 弁理士 青木 朗 外4名

㉓ 指 定 国 AT(広域特許), BE(広域特許), CH(広域特許), DE(広域特許), FR(広域特許), GB(広域特許), IT
(広域特許), JP, LU(広域特許), NL(広域特許), SE(広域特許)

最終頁に続く

特許(内容に変更なし)

請求の範囲

1. 細胞中でのメッセンジャーRNAの成熟及び翻訳を阻害する方法であって、

該細胞を、該細胞の転写生成物に相互的なオリゴヌクレオチド配列及び両親媒性分子を得るために該オリゴヌクレオチド配列に共有結合により連結された基を含んで成る組成物を接触せしめ、これにより該組成物を細胞内に移行せしめて前記転写生成物の成熟及び/又は翻訳の阻害を生じさせる、ことを含んで成る方法。

2. 前記細胞が培養されたものであり、そして前記組成物が栄養培地に導入される、請求項1に記載の方法。

3. 前記オリゴヌクレオチドが約6〜30ヌクレオチドから成るものである、請求項1に記載の方法。

4. 前記オリゴヌクレオチドの少なくとも1つがリン成分としてホスフェートを有する、請求項3に記載の方法。

5. 前記オリゴヌクレオチドの少なくとも1つがリン成分として1〜3個の炭素原子のアルキル基を有するホスホネートを有する、請求項3に記載の方法。

6. 前記基が疎水性芳香族基である、請求項1に記載の方法。

7. 前記芳香族基がトリチル基である、請求項7に記載の方法。

8. 前記芳香族基がフルオレセイン基である、請求項7に記載の方法。

9. 前記基がポリアルキレンオキシ基であり、ここで該アルキレンは2〜10個の炭素原子から成るものである、請求項1に記載の方法。

10. 前記ポリアルキレンオキシ基が約6〜200単位から成るものである、請求項9に記載の方法。

11. 細胞の転写生成物に相補的なオリゴヌクレオチド配列及び両親媒性を得るために該オリゴヌクレオチドに共有結合された両親媒性又は疎水性基を含んで成る組成物を含む細胞。

12. 前記細胞が培養細胞である、請求項11に記載の細胞。

13. 細胞の転写生成物に相補的な少なくとも6個のヌクレオチドから成るオリゴヌクレオチド配列；

アルキレンが2〜10個の炭素原子を有するポリアルキレンオキシ基を含んで成る両親媒性基；並びに

前記オリゴヌクレオチド配列及び前記両親媒性基に共有結合した、少なくとも1個の炭素原子を有するリンカー；を含んで成る組成物。

14. 前記ヌクレオチドが6〜30ヌクレオチドから成るものである、請求項13に記載の組成物。

15. 前記オリゴヌクレオチドの少なくとも1つがリン成分としてホスフェートを有する、請求項13に記載の組成物。

16. 前記オリゴヌクレオチドの少なくとも1つがリン成分として1〜3個の炭素原子を有するアルキル基を伴うホスホネートを有する、請求項13に記載の組成物。

17. 前記連結基が、アミノ、キノン、チオエーテル又はアミド基の少なくとも1つを含む、請求項13に記載の組成物。

摘 要

技術分野

この発明は、発現を抑制するための、溶解度調節成分に結合した特異的ポリヌクレオチド結合ポリマーに関する。

背景技術

細胞内発現の調節を可能とする試薬への興味と必要性が増しつつあるが、この試薬は、遺伝子に関連した様々な問題を解決する上で、至上的可能性をもつことになろう。そういった試薬、特に相補性核酸試薬は、ウイルス本来の遺伝子の発現を抑制する抗ウイルス剤として使用できよう。また、これらは、抗新生物剤としても作用し、ガン細胞の増殖率を下げたり、ガン全体の増殖を抑制する可能性もある。これら試薬は、細胞内で未知の順序によって転写産物に結合し、特定の構造遺伝子の発現を抑制することになろう。

この可能性に関して相当の関心を持たれ、多くの培養実験によれば、この手法はかなり有望視されることが分かってきた。しかし、従来用いられていた数々の手法には多くの欠点もある。治療用として有用な薬剤とするためには、この試薬は、全身投与量を比較的低くできるように、低温度で有効性

18. 前記オリゴヌクレオチド配列が少なくとも部分的に非コード配列に相補的である、請求項13に記載の組成物。

19. 前記オリゴヌクレオチド配列が少なくとも部分的にコード配列に相補的である、請求項13に記載の組成物。

を発揮せねばならない。次に、試薬は、比較的安定であって、様々なヌクレアーゼによる分解に抵抗性を示す必要がある。第三に、この試薬は、長いインキュベーション期間を回避するように、一度細胞質に取り込まれたら迅速に拡散する必要がある。その相補的配列に極めて特異的に結合しなければならない。第四に、試薬は、膜透過性があり、血中で濃度が上昇しないように、低温度で有効性を示さなければならない。最後に、宿主の哺乳類への副作用が最小限であって、免疫反応を出来る限り押えられるオリゴヌクレオチド試薬を提供する必要がある。こういった種々の基準は、様々な程度で妥協が必要であるが、今まで製られた試薬は、一般的には遙かに及ばなかった。

関連文献

単一塩基のミスマッチへの高い感受性を保持し、最大の選択性が得られるような、比較的短鎖のプロープの使用は、以下の論文に示されている。Szostakら、Methods Enzymol. (1979) 68:419-429; Wu, Nature New Biology (1972) 236:198; Itakura および Riggs, Science (1980) 209:1401; Noyes, J. Biol. Chem. (1979) 254:7472-7475; Noyes ラット、Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1979) 76:1770-1774; Agarwalら、J. Biol. Chem. (1981) 256:1023-1028; Tullisら、Biochem. Biophys. Res. Comm. (1980) 93:941; Orkinら、J. Clin. Invest. (1983) 71:775; Connorら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1983) 80:278; Piratouら、

New Eng. J. Med. (1983) 309:284-287; Wallaceら、Gene (1981) 16:21.

ウイルスの複製を抑制する、特異的な核酸配列の使用に関する論文が、多数みられる。例えば、Zamecnik および Stephenson, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1978) 75:280-284; Tullisら、J. Cellular Biochem. Suppl. (1984) 8A:5B (要約); Kawasaki, Nucl. Acids. Res. (1985) 13:4991; Walderら、Science (1986) 233:569-571; Zamecnikら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1986) 83:4143-4146.

各種トリエステルおよびメチルホスホン酸などの修飾核酸も、発現の抑制に有効と見られてきた。Millerら、Biochemistry (1974) 13:4887-4895; Barrettら、上記の論文 (1974) 13:4897-4906; Millerら、上記の論文 (1977) 16:1988-1997; Millerら、Biochemistry (1985a, b) 24:6132 および 6134; Smithら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1986) 83:2787-91; Agriaら、Biochemistry (1986) 25:6268-6275; Millerら、Biochemistry (1986) 25:5092-5097.

相補的配列への結合性を高める修飾型核酸配列は、以下の論文に見られる。Vlassovら、Adv. Eng. Reg. (1986) 301-320; Summerton, J. Theor. Biol. (1979) 78:77-99; Knorre (1986) Adv. Eng. Reg. 1986:277-300.

ポリエチレングリコールに結合するタンパク質の免疫原性の低下については、以下の文献に記載されている。Tomasi および Fallow, W086/04145 (PCT/US85/02572); Abuchowskiら、Cancer Biochem. Biophys. (1984) 7:175-185。米国特許第

4,511,713 号、および米国特許第4,587,044 号も参照のこと。

発明の要約


細胞内発現を調節するために、注目配列に相補的な比較的短い核酸配列、リンカー、および最終産物に両親媒性、通常では親水性より疎水性（親水性によって両親媒性が生じるような）を付与する基を含めて、新規な核酸複合体がいろいろと提供されている。核酸部分には、通常もしくは異常な塩基、リン酸基もしくは修飾リン酸基、または通常の塩基以外の塩基が含まれることがあり、そこでは、修飾によって、対象配列への結合が妨げられない。そういった組成物は、新生物細胞、ウイルス感染細胞中のウイルスタンパク質、ヒトならびに動物の病原体の必須タンパク質（核酸もしくは複製）などで、mRNAの成熟および／または特定の相違遺伝子の発現を抑制するために用いられる。

特定の組成物の説明

この発明は、細胞内でのmRNAの成熟および／または相違遺伝子の発現を抑制する、新規な核酸複合体を提供することを目的とする。各組成物の複合体には、比較的短いオリゴヌクレオチド配列、リンカー、および両親媒性産物を形成するようにHLB（親水性・親油性バランス）を喪失する基が含まれている。生成物の両親媒性は、細胞膜を介しての複合体の輸送に寄与し、核酸配列の水溶性の増大（例えば、長鎖ホスホン酸メチルの水溶性を増大させるような両親媒性基の使用）、

およびエキソヌクレアーゼによる消化に対する正容核酸の安定性亢進などの利点がさらに得られる。

この発明の化合物は、ほとんどが以下の一般式を有する。



Xは一般に、電子対、カルコゲン（酸素もしくはイオウ）、またはアミノ、特にNHを示す。

Zは、天然型もしくは合成の糖基基を示し、それらは五炭糖の2', 3'ならびに5'水酸基の2カ所および六炭糖での相当部位で結合したものである。一般に、糖は、リボースもしくはデオキシリボース、またはその他、アラビノース、キシロース、グルコースもしくはガラクトースなどの五炭糖もしくは六炭糖（特に五炭糖）が適している。

Nは、天然のプリンもしくはピリミジンと結合やハイブリッド形成可能な天然もしくは非天然塩基（プリンもしくはピリミジン）のいかなるものでもよく、これらプリンおよびピリミジンには、アデニン、シトシン、チミジン、グアニジンのような天然型デオキシリボースヌクレオシドのプリンおよびピリミジン、またはウラシル、イノシンのような他のプリンおよびピリミジンなどが挙げられる。

Lは、少なくとも1原子の多機能基に由来するリンカーであって、水素を除いた約60個以下の原子、一般には約30個までの炭素原子を有する、水素を除いた約30個以下の原子、通常では20個以下の炭素原子、および約10個までのヘテロ原子、より一般には約6個までのヘテロ原子、特に

aは、少なくとも5、そして約50以下、通常では約35以下である。

リン成分には、ホスフェート、ホスホラミデート、ホスホルジアミデート、ホスホロチオエート、ホスホロチオネート、ホスホロチオレート、ホスホルアミドチオレート、ホスホネート、ホスホリミデートなどが含まれる。

プリンおよびピリミジンには、チミジン、ウラシル、シトシン、6-メチルウラシル、4, 6-ジヒドロキシピリミジン、イソシトシン、ヒポキサンチン、キサンチン、アデノシン、グアノシンなどが含まれる。

糖には、リボース、アラビノース、キシロース、またはそれらのα-デオキシ糖基が挙げられる。その他のヌクレオシドとして、ヘキソースを利用することができる。

多様なリンカーを、末梢ヌクレオチドの性質、リンカー基がオリゴヌクレオチドの合成中に存在するか否かで選択される官能基、溶解性調節成分上に存在する官能基に応じて利用することができる。多数のリンカーが市販されていて、多官能化合物を連結するために用いられてきた。リンカーには以下のようなものが含まれる。
 $-OCH_2CH_2NHCO(CH_2)_nCONH-$;
 $-OCH_2CH_2NH-X-(CH_2)_nNH-$;
 $-O-P(O)(OR)NHCH(CH_2)_nCONH-$;
 $-OCH_2CH_2NHCO\phi S-$;
 $-NH(CH_2)_nNH-$;
 $O(CH_2)_nO-$;
 $O(CH_2CH_2NH)_n-$;
 $-NH(CH_2)_nSYN-$;
 $-CO(CH_2)_nCO-$;
 $-SCH_2CH_2CO-$;
 $-O(CH_2CH_2NH)_n-$;
 $-NH(CH_2)_nCO-$;
 $-SCH_2CH_2CO-$;
 $-CO\phi NYS-$;
 $-N(CH_2CH_2)_nCH_2NH-$;
 $-O(CO)NH(CH_2)_nNH-$;
 通常では約500 ないし2000ダルトンの

カルコゲン、酸素、リンなど、非オキソカルボニル基（カルボキシカルボニル基）、オキソカルボニル基（アルデヒドもしくはケトン）、またはそれらのイオウもしくは窒素含有原子団、例えば、チオノ基、チオ基、イミジル基など、およびジスルフィド基、アミノ基、ジアゾ基、ヒドラジノ基、オキシミノ基など、ホスフェート、ホスホネートを示す。

Mは、この分子に両親媒性、特にホスフェートに関して疎水性、ホスホネート（これらの炭素：ヘテロ原子の比は、少なくとも2:1、通常では少なくとも3:1、さらに20:1を超えるまで）に関して両親媒性を付与する溶解性調節成分であって、少なくとも6個の炭素原子そして約30個以下の炭素原子を含む炭化水素、ポリオキシ化合物（アルキレンオキシ化合物）を含むことがあり、これらの化合物中では、炭素原子は約2ないし10個、通常では2ないし6個、好ましくは2ないし3個の炭素原子と結合し、少なくとも約6単位、通常では約200 アルキレンオキシ単位以下、より一般には約100 単位以下、好ましくは約50 単位以下であろう。

一方のYはLに対する結合子であって、他方のYは一箇のオキシ、チオ、アミノ、糖もしくはそれらの置換型官能基、または約20炭素原子未満のアルキル基、通常では約6炭素原子未満、Pに結合した場合は、水素1ないし30原子、通常では1ないし12原子のヒドロカルビル基もしくはアクリル基、または1ないし4個のヘテロ原子団（Zに結合する場合、オキシ、チオもしくはアミノ）を有する置換型ヒドロカルビル基もしくはアクリル基である。

ポリグイシン、ポリリジン、ポリメチオニンなどのアミノ酸のホモおよびコポリマー（電荷の有無に拘らない）。式中、Xは2, 5-キノンジルを示し、Yは、スクシニミジルを形成する（3-スクシンジオイル）を示し、nは、通常では2ないし20の範囲、より一般には2ないし12であって、mは、1ないし10、通常では1ないし6である。


親油性／両親媒性基には、様々な原子団があり、脂肪族、芳香族、脂環式、複素環式化合物、またはこれらの組み合わせが挙げられる。それらの化合物は、炭素原子2個あたりヘテロ原子1個または0個を有し、電荷の有無に拘らない、通常では炭素数が少なくとも6、より一般には12、および約500以下、通常では約200以下から成る。これらには以下のものが含まれる。炭素数が少なくとも6、そして約30未満、通常では約24以下から成るアルキル基であって、炭素数が少なくとも約6、通常では少なくとも約12、そして約24未満からなる脂肪酸、脂肪酸の炭素数が一般には約12ないし24個の範囲にあるグリセリド（それには、一般に2もしくは3位または両位置で1ないし2個の脂肪酸が付いている）、1ないし4個の環を有する芳香族化合物、アルキレンの炭素数が2ないし10、一般には2ないし6、より一般には2ないし3である、モノもしくはポリ環式、融合もしくは非融合のポリアルキレングリコール、通常では少なくとも約6単位、より一般には少なくとも約10単位、そして一般には約500単位未満、より一般には少なくとも約200単位未満、好ましくは約100単位未満であって、アルキレングリコールがホモ

ポリマーまたはコポリマーであり得るもの；アルキル基の炭素数が少なくとも約6、一般には少なくとも約10、および約24以下、一般には約20以下のアルキルベンゾイル；アルキル基の炭素数が少なくとも約6、一般には少なくとも約12、および約24以下、一般には約20以下のアルキルホスフェートもしくはホスホネートなど。

溶解性調節成分は、生理的条件下で荷電しているかまたは非荷電（非荷電が好ましい）であって、通常では水素以外の原子10個の基あたり1電荷を有するものである。例えば、約40ないし50単位のポリエチレングリコール、エチレンとプロピレングリコールとのコポリマー、ポリエチレングリコールのラウリル酸エステル、トリフェニルメチル、ナフチルフェニルメチル、パルミテート、ジステアリルグリセリド、ジドデシルホスファチジル、コレステリル、アラキドニル、オクタデカニロキシ、テトラデシルチオなどの基が挙げられる。

可能性のある官能基には、オキソ、チオ、カルボニル基（オキソもしくは非オキソ）、シアノ、ハロ、ニトロ、脂肪族の不飽和基などが含まれる。

以下の一般式のオリゴヌクレオチド接合体が、特に興味深い。



X' は、窒素または酸素を示す。

Z' は、3' および 5' 位で置換されたりボースまたデオ

キシリボースを示す。

1個のY' はL' への結合であり、そして他のY' は炭素原子数0〜3のヒドロキシ、アルキル、アルコキシ又はアミノ（置換されたアミノ、例えばアルキル、アシル等を含む）、又は5炭糖、特にリボース又はデオキシリボース（P及び水素への結合の場合）、アルキル、又は炭素原子数1〜10個、通常1〜6個のアシル、またはアルキル（Z' に結合する場合）である。

N' は天然プリン及びピリミジンにハイブリダイズすることができる任意のプリン又はピリミジンであるが、好ましくは天然プリン又はピリミジンである。

L' は、炭素数が少なくとも約20、そして約30以下、一般には約20以下のリンカーを示し、酸素、窒素ならびにイオウ、特にオキシ、アミノもしくはチオである0ないし10個、一般には1ないし6個のヘテロ原子を有する。

M' は、好ましくは少なくとも約20単位、そして約200単位以下、通常では約150単位以下のポリアルキレンオキシ基の溶解性調節成分であって、疎水性または両親媒性を示し、そのアルキレン基は、炭素数が2ないし3から成る。

a' は、少なくとも5、通常では少なくとも7、そして通常では約50以下、一般には約30以下、より一般には約10ないし30、好ましくは約13ないし30である。

この発明の組成物を調製する際、上記のオリゴヌクレオチドおよび溶解性調節成分は、通常では独立成分として存在し、リンカーアームによって結合可能である。オリゴヌクレオチド

は、任意の便利な合成法によって調製できる。組換え法は、ほとんど利用できないが、有用となる場合がある。ポリヌクレオチドを調製するための合成装置の各種市販品がApplied Biosystems Inc., Bioscience Inc., およびPharmacia など多数の会社から入手できる。トリエステル、ホスホラミディチイ、ホスホネートなどとしてブロックオリゴヌクレオチドを使用するために、数々の方法が知られており、環化法が用いられると、個々のヌクレオチドは連続して添加される。

合成の終了時点では、様々なプロトコルを使用できる。殆どの場合で、末端のブロック基を除去することができ、末端ヌクレオチドは、リンカーの添加によって修飾することができ、リンカーが最終のオリゴヌクレオチドに特異的となり得る。末端のブロック基がリンカーの全体または一部として作用し得る場合もある。また、オリゴヌクレオチドは担体から除いて、さらに操作することもでき、その際、特に担体に対するリンカーが疎水性の修飾域を結合するためのリンカーとして使用可能である。オリゴヌクレオチドの5' または3' 末端をさらに分画するための様々な方法が、Chu およびOrgel, DNA (1985) 4:327-331; ConnollyおよびRider, Nucl. Acids Res. (1985) 13:4485-4502に見られる。

官能基に応じて、アミン、エステル、無機ならびに有機の酸素ならびにイオウエーテル、アミンなどを産出するために、様々な反応が利用できる。カルボキシル基と作用させる場合、カルボニルジイミダゾール、カルボジイミド、スクシンイミジルエステル、p-ニトロフェニルエステルなどの様々な活

実 施 例

実施例 1

Amnolink(アミノリンク)、ベンゾキノンおよびビス(アミノヘキシル)ポリエチレングリコールを用いた、正常 DNA のポリエチレングリコール複合体の合成

アミダイト法による DNA オリゴヌクレオチドの化学的合成

DNA の化学的合成は、市販のいかなる DNA 合成装置により、従来のホスホラアミダイト法を若干変えて実施した。この方法は、Caruthers が記載した手法 (Beaucage および Caruthers、欧州特許出願第 82/102570 号) の変法である。

この方法では、無水アセトニトリルに溶解した 0.1 M スクレオチドホスホラアミダイトを等量の 0.5 M テトラゾールと混合してから、コハク酸塩スプレーを介して対照の細穴ガラス支持体に結合した成長 DNA 鎖の 5' 水酸基末端のスクレオチドにカップリングさせた (Matteucci および Caruthers、Tetrahedron Letters (1980) 21:719-22)。スクレオチドの添加に、無水酢酸による未反応 5' 水酸基へのキャップ反応の付加、ヨウ素酸化、およびトリクロロ酢酸-塩化メチレン中での 5' 脱トリチル化を行った。続いて、樹脂結合オリゴマーを、無水アセトニトリル中での徹底した洗浄によって洗脱させ、この工程を繰り返した。この方法を用いた正常の周期は、98% を超える結合効率で 12 分であった (トリチル基の阻害によって判定)。

に関する様々な発現、産生の様々な分布などの影響を評価するような特定の使用方法がある。この発明の組成物の細胞内輸送には特殊な添加物を必要としないが、この発明の組成物は、リポソームやその他の粒子中へのカプセル化によって修飾が可能であり、例えば、非イオン性界面活性剤、センダイウイルスなどの送達剤との結合に使用することもできる。

in vitro 投与では、特定の目的に応じて、この発明の組成物を、注射、注入、錠剤などの様々な方法で投与できるので、組成物は、経口、経鼻内、経眼内、皮下、筋内など投与することができる。組成物は、様々な方法で錠剤化が可能であって、炭酸水、水、リン酸緩衝生理食塩水、エタノール、水溶性エタノールなどの様々な生理学的に安全な溶媒に溶解することができる。またはリポソームもしくはアルブミン微粒子に錠剤化できる。

適用および投与方法が多岐であるので、特定の組成物を示唆することはできない。むしろ、各適用において、この発明の組成物は、従来方法での試験が可能であって、適切な組成を実験的に決定することができる。安定剤、緩衝液、添加剤、界面活性剤、賦形剤などを含めることもできる。これらの添加剤は従来からあり、通常では約 5 重量% 未満、一様には 1 重量% 未満で含有し、適宜、有効量とする。賦形剤については、活性物質の必要量に応じて 99.9% を超えるまで含めることができる。

以下の実施例は、例示のために提供するものであって、限定するためではない。

合成の最終段階として、産物のオリゴヌクレオチド鎖から除去し、Amnolink (Applied Biosystems, Foster City, CA) を用いてアミノエタノールホスホラアミダイトを 5' 水酸基に付加した。続いて、樹脂結合オリゴヌクレオチドは、脱保護し、ホスフェート型の結合に与えた方法を用いてカラムから除去した。

通常のホスホジエステルの場合、カラムからの除去および加水分解アンモニウム中 55℃ で一晩の加水分解が与えられた。

続いて、産物を 50% エタノールから抽出して乾燥し、逆相 HPLC C-8 シリカ充填カラムにより、5 ないし 50% のアセトニトリル/25 mM 酢酸アンモニウム (pH 6.8) の溶出液で洗脱勾配をかけて精製した。必要に応じて、この物質は、20% アセトニトリル/25 mM 酢酸アンモニウム (pH 6.5) を溶出液に用いて、Nucleogen DEAE 80-7 充填のイオン交換 HPLC によって一層の精製を行うことができる。次に、回収された産物は、15% ポリアクリルアミドゲル電気泳動によってその特徴を調べた。この電気泳動は、Maxam Gilbert, Method of Enzymology (1980) 68:499-560 に記載された通りに実施した。仕上げ後のゲル中のオリゴヌクレオチドは、Stain-o-ill を用いて視覚化した。この Stain-o-ill 法は、DNA メチルホスフェートまたはエチルトリエステルなどの非電荷ヌクレオチドには作用しなかった。


完全に脱保護して精製した産物は、続いて、適切なカップリング法を用いて適当なポリエチレングリコール複合体に付

化する。ベンゾキノン、カルボジイミド、SHCC (スクシンイミジル 4-(N-マレイミドメチル)-シクロヘキサノ-1-カルボキシレート)、SPDP (N-スクシンイミジル 3-(2-ビリジルジチオ)プロピオネート、カルボニルジメチル、Amnolink、ジスクシンイミジルスベリミダイトおよびフェニルイソチオシアネートを含有するいくつかの方法を用いることができる。

ベンゾキノンへのリンカー鎖 DNA のカップリング、およびビス(アミノヘキシル)ポリエチレングリコールへの架橋

最初の工程で、ビス(アミノヘキシル)ポリエチレングリコールを、0.1 M 炭酸ナトリウム溶液 (pH 8.5) に溶解したベンゾキノンのモル比で 100 ないし 1000 倍過剰量と反応させる。室温で 1 時間後、過剰な未反応ベンゾキノンをセファデックス G-25 のカラムクロマトグラフィーで除去する。続いて、活性化されたポリエチレングリコールを 0.1 M 炭酸ナトリウム溶液に添加し、モル比 10:1 で反応性のアミンリンカー鎖を含む DNA オリゴマーと反応させ、反応を完了させた。反応 (通常では一晩) の終了時、未反応オリゴマーをセファデックス G-100 のゲル濾過によって除去し、複合体の特徴は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動によって調べる (Maniatis ら、Molecular cloning, A laboratory manual (1982) Cold Spring Harbor, NY 参照)。必要に応じて一層の精製を、イオン交換クロマトグラフィーおよびゲル電気泳動を用いて行うことができる。

これらの反応産物の構造式は以下のとおりである。




実施例2

Aniolink およびカルボニルジイミダゾール活性化ポリエチレングリコールを用いた、正常DNAのポリエチレングリコール担体の合成


この実施例では、Aniolink オリゴスクレオチドを、実施例1での記述と同様に合成した。オリゴマーを支持体から除去し、アンモニア中で脱保護した後、溶液を真空蒸発乾燥し、1M炭酸ナトリウム溶液 (pH 8.5) で0.1 Mとしてから、G25 スパンカラム上で精製し、この物質をナトリウム塩に転化して低分子量の夾雑アミン含有物質を除去した。この溶液は、続いて、カルボニルジイミダゾール活性化ポリエチレングリコール (平均分子量=20,000) の0.2 M溶液とし、23℃で一晩反応させた。

未結合オリゴスクレオチドをセファデックスG100のゲル濾過によって除去した。このカラムクロマトグラフィーにおいて、複合体がカラムの非担体液中に溶出し、遊離のオリゴスクレオチドおよび未結合ポリエチレングリコールは遅れて溶出した。続いて、この物質を真空中で乾燥し、複合体の特



そしてオリゴマーのアミノリンカーアームを次のようにしてNH-S-スクシニルモノメトキシオキシポリエチレングリコール (NH=5000)と結合させる。オリゴスクレオチドを、0.15M NaClを含む50mMリン酸ナトリウム緩衝液、pH 7.1中、リットル当り100 μlの最終濃度に溶解する。この溶液に10倍モル過剰のSS-PEG(5000)を乾燥固体として添加し、溶解させ、そしてその反応混合物を25℃にて一晩インキュベートする。次いで生成物を、水中のSephadex G-100上でのゲル濾過クロマトグラフィーにより精製し、そしてポリアクリルアミドゲル電気泳動により特徴付ける。

最終生成物の精製は下記のものである：



例4

イミダゾール活性化カルボン酸エステルおよびビス-アミノアルキルポリエチレングリコールを用いた正常DNAのポリエチレングリコール担体の合成

この例では、例1において与えられた方法に従ってDNAを合成した。合成後、生成物は、該分子の5'-端からトリチルが遊離された状態で合成支持体上に保持された。ついで

微をポリアクリルアミドゲル電気泳動にて解析した (Maniatisら、(1982)上記文献)。

例3

ホスホロアミデートリンカーアミンおよびN-ヒドロキシスクシニイミジル活性化ポリエチレングリコールを用いた正常DNAのポリエチレングリコール担体の合成

この方法では、アミノリンクホスホロアミダイトのさらなる付加なしでトリチル基を除去すること以外は例1のようにして、DNAを合成する。ポリアクリルアミドゲル電気泳動による精製の後、精製法 (Millerら、Nucleic Acids Res. (1988) 11:6225-42; Maniatisら、(1982)、前掲; MaxamおよびGilbert、Proc. Nat'l Acad. Sci. USA (1980) 74:560-5) に従って、T4ポリヌクレオチドキナーゼの前向き反応により、生成DNAをリン酸化する。ラベル化されたオリゴマーは、DEAEクロマトグラフィーおよびC-18逆相カラム (例えばWaters C-18 SepPak) により、未反応のATPから分離され得る。試料を、分析用の20%ポリアクリルアミドゲル上で均一についてチェックする。

次いでリン酸化されたオリゴマーを、Chu およびOrgol, DNA (1985) 4:327-31の方法に従って、EDCカルボジイミド存在下で1-メチルイミダゾールおよびヘキサジアミンで処理する。この反応は、次の精製を有するホスホロアミデート結合を介してジアミンリンカーをオリゴスクレオチドに共有結合でつなぐ。

該固体材料を無水アセトニトリルで十分に洗滌し、そして乾燥アルゴンの流れのもとで風乾させる。プラスチックのシリンジを使って、無水アセトニトリル中に溶解された0.3 Mカルボニルジイミダゾール1 ccを、オリゴマーを結合した支持体を含む合成カラムを通して1時間に亘ってゆっくり押し出した。該カラム上の5'-カルボニルイミダゾール活性化オリゴマーを1.5 mlのアセトニトリルで洗って過剰の試薬を無くし、続いてアセトニトリル中0.1 Mのビス (アミノヘキシル) ポリエチレングリコール、水、アセトニトリルおよび塩化メチレンで16時間連続して処理した。ポリエチレンオリゴマー複合体を、緩和水酸化アンモニウムで溶出し、そして55℃での5時間のインキュベーションにより同様に脱保護した。

次にその反応生成物を、10 mM Tris, pH 7.5を1分当り0.5 mlにて流すTSW 640005Mカラム上での高性能ゲル濾過クロマトグラフィー (BPGFC)により精製する。アガロースゲル電気泳動によりさらに精製を行ってもよい。この方法により合成された最終複合体の精製は次のようである：



例5

イミダゾール活性化カルボン酸エステルおよびアミノリンカーを用いた正常DNAの最終アルカン担体の合成

この例では、例1において与えられた方法に従って、マウスのβ-グロブリンmRNAの開始領域に相補的な20ヌクレオ


チドのDNAを合成した。生成物は、該分子の5'-端からトリチルが遊離された状態で合成支持体上に保持された。ついで固体材料を無水アセトニトリルで十分に洗浄し、そして脱塩アルゴンの流れのもとで風乾させる。プラスチックのシリンジを従って、無水アセトニトリル中に溶解された0.3 Mカルボニルジイミダゾール1ccを、支持体に結合したオリゴマーを含む合成カラムを通して45分間ゆっくりと押し出した。該カラム上の5'-カルボニルジイミダゾール活性化オリゴマーを15 mlのアセトニトリルで洗って過剰の試薬を無くし、続いてアセトニトリル：水（10：1）中0.2 Mのデカンジアミンで30分間処理した。該カラム上の該物質をアセトニトリルおよび水で洗って未反応のデカンジアミンを無くし、加水酸化アンモニウムで溶出した。カラムからの溶出の後、オリゴマー接合体を含む水酸化アンモニウム溶液を封管バイアル中に入れそして55℃にて5時間インキュベートした。

次いで、生成物を50%水性エタノールから数回凍結乾燥し、そして逆相HPLC C-8シリカカラムにより、直鎖型配位において5~50%アセトニトリル/2.5 mM酢酸アンモニウム、pH 6.8で溶出して分離した。必要であれば、溶出液として20%アセトニトリル/2.5 mM酢酸アンモニウム、pH 6.5を従ったNucleogen DEAE 50-7 上でのイオン交換クロマトグラフィーにより、さらに分離してもよい。回収された生成物を、Maxam および Gilbert により $Math. Enzymol.$ (1980) 68:499-560 中に記載されたようにして行う1.5%ポリアクリルアミドゲル中でのゲル電気泳動により特徴付けた。終了したゲル

中のオリゴヌクレオチドはStains-allを従って可視化された。

第一アミンの存在は、二つの方法により決定された。第一は、フルオレスカミンとの反応は第一アミンの存在に特徴的な蛍光生成物をもたらすが、アミンリンカーを欠く以外同じタイプの対照オリゴマーを同様に処理しても蛍光は全く観察されなかった。第二は、デカン接合体を100 μ lの0.1 M炭酸水素ナトリウム中に溶解し、これに1 μ gのフルオレセインイソチオシアネート(FITC)を加えた。1時間のインキュベーション後、Sephadex G-25 スパンカラム上でのゲル濾過により、未反応のFITCを除去した。次いで生成物を、前述のようにポリアクリルアミドゲル電気泳動により分析し、そしてUV照明のもとで生成物の蛍光バンドを可視化した。Stains-allでの次なる染色により可視化されたオリゴマーと一致する単一の蛍光バンドが観察された。

この反応の生成物は、塩基基への穏和な暴露に対し安定であるアルキルカルバメートである。この方法により合成される最終接合体の構造は次のものである：



この方法により他のモノアミノアルキルおよびアリアル胺基体が製造され得る。形成されているこのシリーズの他の分子は、エチレンジアミンおよびヘキサレンジアミンを従った胺基体を包含する。長鎖の付加は、必要に応じて達成するために接合体の毒性を低くする必要とするかもしれない。また、反応時間を延長するならば、低収率を使うことができる。

例 6

イミダゾール活性化カルボン酸エステル、ポリリジンリンカー、DSSおよびBIS-アミノアルキルポリエチレングリコールを従ったDNAのポリエチレングリコール配位体の合成

この例では、例1において与えられた方法に従って、マウスの β -グロブリンmRNAの開始領域に相補的な25ヌクレオチドDNAを合成する。合成後、合成支持体を80%酢酸で30分間処理し、該分子の5'-端からトリチルを除去した。ついで固体材料を無水アセトニトリルで徹底的に洗浄し、そして脱塩アルゴンの流れのもとで風乾させ、そして例4に記載したようにして0.3 Mカルボニルジイミダゾールで処理した。該カラム上の5'-カルボニルジイミダゾール活性化オリゴマーを15 mlのアセトニトリルで洗って過剰の試薬を無くし、そして0.1 Mリン酸ナトリウム、pH 8を含む50%アセトニトリル中に溶解された0.2 Mポリ-L-リジン (MW=1000) で室温にて16時間処理した。カラム上の物質を、水およびアセトニトリルで洗って塩および未反応のポリリジンを除去し、そして加水酸化アンモニウムでカラムから溶出した。カラムからの溶出の後、オリゴマー接合体を含む水酸化アンモニウム溶液を、封管されたガラスのバイアル中に入れそして55℃にて5時間インキュベートした。

次いで、生成物を50%水性エタノールから数回凍結乾燥し、そして1.0 mMトリス緩衝液、pH 7.5 中、TSX G4000SH 上でのゲル濾過クロマトグラフィーにより分離した。第一アミ

ンの比率は、フルオレスカミンとの反応により決定された。ポリアミンリンカーを欠く対照のオリゴマーでは蛍光が全く観察されなかった。


ポリアミン接合体を負に荷電させるために、該接合体をFITCで処理して該分子をラベルしそしてアミン上の正電荷を中和した。これは、該物質の一部を100 μ lの0.1 M炭酸水素ナトリウムに溶解し、これに1 μ gのFITCを添加することにより達せられた。1時間のインキュベーションの後、未反応のFITCを、Sephadex G-25 スパンカラム上でのゲル濾過クロマトグラフィーにより除去した[Maniatis ら、(1982)、前掲]。次いでMaxam および Gilbert (1980) 前掲により記載されたように行うポリアクリルアミドゲル電気泳動によって生成物を分析した。Stains-allで可視化されたDNAと一致するブロードな蛍光バンドが観察された。

分子の5'-端に共有結合で連結されたポリリジンを含むオリゴマーを、次のようにビス-(アミノヘキシル)ポリエチレングリコール (MW=3500) と架橋させた。該ポリエチレンオリゴマーをまず0.1 M炭酸ナトリウム、3M NaCl に対して透析し、そしてCentricon 10装置 (Amicon, Danvers, N.J.) を従って4 μ g/mlの最終濃度に濃縮した。この濃度50 μ lに2.5 μ lのジスクシニミジルスベレート (DSS, 10 μ g/ml DMSO 中) を添加し、そしてその混合物を室温で10分間インキュベートした。次いで未反応のDSSをSephadex G25上でのクロマトグラフィーにより直ぐに除去し、そしてCentricon 10 装置で濃縮した。濃縮をビス-(アミノヘキシル)ポリエチレ

ングリコール中0.2 Mに作り、そして室温で一晩インキュベートして最終接合体を形成せしめた。前述のように操作してTSX G4000SW カラム上で精製を行った。

この接合体は次の一般式を有する：

1. 製品タイプ I



上式中、Xは普通Hであるが、少なくとも1つのXが $-\text{CO}(\text{CH}_2)_n\text{COHN}-\text{PEG}_m\text{...}$ である。

使われる反応基またはポリエチレングリコールおよびポリリジンの分子長を変更することにより、色々な大きさの置換基のサイズおよび電荷を有するポリマー接合体を作製することが可能である。接合体のこれらの性質を変更することは、様々な用途における接合体の利用を企及することを可能にする。

例 7

DNAメチルホスホネートのポリエチレングリコール接合体の合成

DNAメチルホスホネート(MP)の化学合成は、Letsingerのホスホクロリダイト法の変法を用いて行うことができる[Letsingerら、*J. Amer. Chem. Soc.* (1975) **97**:3278; LetsingerおよびLunnford、*J. Amer. Chem. Soc.* (1976) **98**:3605-3661;

Anmolink(Applied Biosystems, Foster City)で樹脂を5分間処理する。次いで上記のようにリンカーアームのオリゴヌクレオチドをヨウ素中で酸化しそしてアセトニトリル中で洗浄する。脱保護されたいずれの第一アミンも塩基-安定性アセトアミドに修飾されそのためさらなる反応に無効であるので、無水酢酸でのブロックは行わない。

合成の最後に、アミン末端のリンカーアームのメチルホスホネートオリゴマーを次のようにして脱保護する。DNAを含む樹脂をカラムから取り出し、ウォータージャケット付ラムの中に入れ、1~2%のフェノール：エチレンジアミン(4:1)中40℃で10時間インキュベートする。フェノール：エチレンジアミン中でのインキュベーションの後で、メタノール、水、メタノール及び塩化メチレンを使って連続して樹脂を洗浄し、塩フェノール試薬及び塩基保護基を除く。廃液での乾燥の後、塩基-脱保護された塩を、EDA：エタノール(1:1)または水酸化アンモニウムによる室温での穏やかな処理を使って支持体から開裂せしめる。

アミン-末端DNAメチルホスホネートの精製を次のように行う。該物質を50%水性エタノールから微画印結乾燥し、そして逆相HPLC C-8カラムを過して直線勾配において5-50%アセトニトリル/25mM酢酸アンモニウム、pH6.8で溶出させて精製する。フルオレスカミン反応性により決定した、アミン-含有フラクションをプールし、真空中での乾燥により生成物を回収し、そして20%アセトニトリル/25mM酢酸アンモニウム、pH6.5で溶出させるNucleogen DEAE

TanakaおよびLetsinger、*Nucl. Acids Res.* (1982) **25**:3249-601。

この方法では、無水アセトニトリル2, 6-ルチジン中に溶解された乾燥保護ヌクレオチドを化学置換口のメチルジクロロホスフィンによりその塩で(in situ)活性化する。活性化されたヌクレオチドモノクロライドを、スクシネートスベーターを媒介して調節多孔質ガラスに結合した伸長DNA鎖のヌクレオチドの5'-水酸基に順次付加せしめる[Matteucci及びCaruthers、*Tetrahed. Lett.* (1980) **21**:719-722]。各付加の後で、無水酢酸による未反応5'-水酸基のブロック、ヨウ素酸化、および3%トリクロロ酢酸-塩化メチレン中での5'-脱トリチル化を行う。

次いで、樹脂に結合したメチルホスホネートオリゴマーを無水アセトニトリル中での十分な洗浄により乾燥し、そしてこの工程を繰返した。この方法を使った通常のサイクル時間は23分であり、>82%の縮合効率を伴う(トリチル脱離により判断)。塩基での開裂の際に5'-末端のリン酸ジエステルを生じるシアノエチルホスホトリエステルとして最後の塩基を添加してもよい。この段階は、開裂の中間段階においてオリゴヌクレオチドを放射能ラベルし、ゲル電気泳動を使って生成物を精製しそして配列決定することを可能にする[Narangら、*Can. J. Biochem.* (1975) **53**:392-394; Millerら、*Nucl. Acids Res.* (1983) **11**:6225-6242]。

アミン-末端リンカーアームを次のように付加する。上記のようにトリチルを除去し、そして0.2 Mジメチルアミノピリジンを含む乾燥アセトニトリル中に溶解された0.2 M


50-7上でのイオン交換クロマトグラフィーによりさらに精製する。

ついで精製された生成物を、ヘテロ二価性架橋剤SHCCおよびSATA(スクシンイミジルS-アセチルチオアセテート)を使って適当なポリエチレングリコール接合体に変換する。ヌクレオチド塩基と反応しそして修飾する他の試薬(例えばスルホニクロライド、グルタルアルデヒド又は酸無水物)は、まだ合成支持体と結合し十分にブロックされたオリゴヌクレオチドを用いて行わない限り、塩基されない。

5'-末端の反応性アミンリンカーアームを含むDNAメチルホスホネートをまずpH8.5(0.1 M炭酸ナトリウム)にて100~1000倍モル過剰のSATAと反応させる。室温で30分後、水中でのG-25カラムクロマトグラフィーにより余分な未反応のSATAを除去し、真空中で乾燥し、そして次の反応の用意ができるまで冷却保存する。0.1 Mリン酸緩衝液、pH6.9中での100~1000倍モル過剰のSHCCとの室温での1時間の処理により、ポリエチレングリコールをマレイミド接合体に変換する。Sephadex G-100上でのクロマトグラフィーにより過剰の架橋剤を除去し、該物質を真空中で乾燥し、そして次の反応の用意ができるまで冷却保存する。この物質は冷却保存すれば約1週間の間安定である。次いでSATA DNAメチルホスフェートを、0.1 Mリン酸緩衝液中に溶解された塩化ヒドロキシアミン(pHを7.2に調整)で1~2時間処理する。この処理は反応性のスルフィドリルを遊離させるために提供される。この生成物を10倍モル過剰のビス-(SHCCアミノヘ

キシル)と、オリゴマーを含む溶液に殺菌を効果として添加することにより反応させる。

次いで該複合体の精製を行う。非結合のオリゴヌクレオチドを、10mMトリス、pH7.5で溶出させるSephadox G-100上でのゲル過渡またはTSK G4000SH上でのHPLCにより除去する。この手順の最終生成物の提純の精製は、次のものである。



例 8

ホスホリアルミジト法を用いるDNAアルキルトリエステルのポリエチレングリコール誘導体の合成

該誘導体のトリエステルの合成は、Zonらの方法(Galloら、*Nucl. Acid Res.* (1986) 14:7405~20; Suonensら、*Nucl. Acid Res.* (1986) 14:7421~38)に従って行なわれる。この合成方法は他の例に記載されているようなエチルトリエステルのその場での製造に用いられる方法と同じである。完全にブロックされたジメトキシトリチルヌクレオシドはベンゼンから繰り返し抽出乾燥することによって乾燥され、無水アセトニトリル/2、5-ホルチンに溶解され、-70℃で同じ溶液中のクロロジソプロピルアミノエチルホスフィン

の塩溶液に滴下添加される。生成物は、水抽出、真空乾燥およびシリカゲルクロマトグラフィーによって回収される。

DNAエチルトリエステル(ETE)の化学合成は、従来のホスホリアルミジト法をわずかに改良した方法を用いて行われる。この方法において、無水アセトニトリルに溶解したヌクレオシドホスホリアルミジドをテトラゾールと混合し、続いて5'-ヒドロキシ末端ヌクレオシド結合に結合する。ヌクレオシド添加後、未反応5'-ヒドロキシルと無水酢酸との結合、沃酸酸化、およびトリクロロ酢酸-塩化メチレン中での5'-脱トリチル化を行なう。次いで樹脂結合オリゴマーを無水アセトニトリル中の大量洗浄によって乾燥し、このプロセスを繰り返す。この方法を用いる通常の周期時間は、96%以上の結合効率で(トリチル放出により判断)、17分である。放射ラベルおよび精製を促進するためジエステルとして末端基を加えることが都合がよい。HPLC精製を望む場合、5'-末端トリチル基が欠けているが、通常5'-末端トリチルは除去され、例1に記載のアミノ結合法を用いる。

合成の最終において、完全にブロックした生成物を以下のようにして塩基-脱ブロックする。完全に保護されたDNAを含む樹脂をカラムから取り出し、水-外液クロマトグラフカラムに入れる。次いでこの樹脂を1~2%のフェノール:エチレンジアミン(4:1)中に40℃で10時間インキュベートする。フェノール:エチレンジアミン中でのインキュベーションの終了時に、フェノールを含まない試薬で洗い、メタノール、水、メタノールおよび塩化メチレンを続けて洗い

て塩基保護基を分解する。真空条件下で乾燥後、EDA:エタノール(1:1)を用いてまたは室温における水酸化アンモニウムによる簡単な処理を用いて支持体より塩基-脱ブロック化傾向を開発する。

次いで、アミノリンクDNAエチルトリエステル生成物の精製を以下のようにして行なう。この物質をまず約50%メタノール水溶液より抽出乾燥し、5-50%アセトニトリル/2.5mM酢酸ナトリウム、pH6.8の直線勾配で抽出する逆相HPLC C-8シリカカラムによって精製する。フルオレサミン反応性によって決定したアミン含有百分を定め、真空乾燥により生成物を回収し、さらに2.5%アセトニトリル/2.5mM酢酸アンモニウム、pH6.5で抽出するNucleogen DEAE 60-7のイオン交換HPLCによって精製する。


生成物であるオリゴヌクレオチドは、前記のあらゆる方法によるポリエチレングリコールへの結合に相当である。我々の実験において、SHCC、SPDP、カルボニルイミダゾール、ジスクンイミジルスベリミデートおよびフェニルイソシアネートを含む多くの方法が用いられた。

SHCC/SPDP結合反応は以下のとおりである。結合アームグループを過剰のSPDPと結合させ、続いてジチオスレイトール(DTT)による還元、未反応DTT除去および過剰スルフィドリルによるビス(アミノヘキシル)ポリエチレングリコール(PEG)へあらかじめ結合したSHCCへの架橋を行なう。チオエーテル結合の形成は急速であり、選択的であり、形成した結合は種々の条件に対し全く安定である。

DNA含有アミン結合アームをpH8.5において(0.1M碳酸ナトリウム)、100~1000倍モル過剰のSPDPと反応させる。室温で1時間後、G-25カラムクロマトグラフィーで過剰の未反応SPDPを除去し、ブルーSPDP共役体を真空下乾燥する。ビス(アミノヘキシル)ポリエチレングリコールを前記例に記載されたようにしてマレイミド誘導体に反応させる。SPDP DNAトリエステルを0.1M碳酸バッファー(pH7.2)に溶解した10mMメルカプトエタノールで1時間処理する。この処理により5'-チオビリド分が分離され、反応性スルフィドリルが形成する。過剰の還元剤は、末端SHの再酸化を防ぐためすべての分離を真空下脱気した0.1M碳酸バッファー、pH6.8内で行なうことを除いて前記のようにG-25カラムを用いて行なわれる。この方法において、マレイミジル化ポリエチレングリコールとその後の反応を防ぐため、すべての過剰の還元剤を除去することが重要である。

この方法において分離されたチオビリドンは、5'-末端SHの存在を定量的に提供する方法を提供する。還元によって分離されたチオビリドンは343nmにおいてUV吸収を有する。この波長における溶液の吸収の増加することにより、一度の還元が容易に追跡できる。次いで、8080のモル濃度係数を用いてチオビリドンを定量的に測定する。次いで粉末あるいは塩溶液としてSH末端オリゴマートリエステルを含む溶液に加えることによって、生成物を10倍モル過剰のビス(SHCC-アミノヘキシル)ポリエチレングリコールと一晩反応させる。この反応を一晩25℃で行なう。

次いで複合体の精製を行なう。10 mM Tris, pH 7.5 で溶出する Sephadex G-100 または TSK G4000SW の BPGFC によるゲル过滤によって、結合していないオリゴヌクレオチドを除去する。この方法の最終生成物の精製は下式で表わされる。



51 9

相融トリエステル法を用いるDNAアルキル並びにアリール
トリエステルのポリエーテル陰陽体の合成


和々のアルキル並びにアリール置換基のホスホトリエステ
ルオリゴヌクレオチドの合成

可変アルカン鎖長を有する短々のトリエステルの類も有効な固相方法は、*tert*-ブクロロフェニルホスフェートトリエステル(PTE)として短む配列を合成する従来のホスフェートトリエステル化学による。合成の終了の際、合成支持体に結合した完全に保護されたオリゴヌクレオチドクロロフェニルトリエステルをテトラブチルアンモニウムフルオリドおよびアルコールの存在下エステル交換する。DNAオリゴヌクレオチド合成の基本的方法は古典的DNA合成化学である。Galtの *Oligonucleotide Synthesis: A Practical Approach*, IRL

ら、Can. J. Biochem. (1975) 53:392~4; Miller ら、Biochemistry (1986) 25:5092~97)。

合成支持体に結合した完全にブロックされた物質をテトラブチルアンモニウムフルオリド (TBAF) およびアルコールの存在下無水条件でエステル交換する。この方法により急速なおよび定量的アルコール交換が生ずる。この方法は安定な生成物を形成できる大部分のアリール並びにアルキルアルコールに対し 20 分で終了する。

この例において、最終粘度0.2 MにTBAFを溶解するため含水n-プロパノールを用いる。次いでこの溶液をゆっくりオリゴマーククロフェニルトリエステルを含む樹脂上に注ぎ、約1時間室温で反応させる。次いでこの樹脂をメタノール並びにアセトニトリルで洗い、乾燥アルゴン流下で乾燥する。例8のようにアミン結合アーム添加、脱ブロック、および精製を行なう。ポリエチレングリコール結合を例7のようにして行なう。結合体の最終収率は、用いたスクレオシド樹脂の約10%である。最終生成物の精製は下式で変えられる。



Press, Washington D.C. (1984) 参照.

DNA-あるいは α -クロロフェニルホスホトリエステルの化学合成は、Letsinger, Tanaka, Nucl. Acids Res. (1982) 25:3249~60のホスホクロリジンの改良法を用いて行なわれた。

無水アセトニトリル 2, 6-ルチジンに溶解し、クロロフェノキシジクロロホスフィンによりその場で活性化された完全にブロックされたおよび乾燥したヌクレオシドを、前記例のスクシネートスプレーサーにより制御細孔ガラス支持体に結合した成長している DNA 鎖の 5'-ヒドロキシ末端ヌクレオチドに加える。制御ガラス支持体、完全にブロックされたヌクレオシドおよび他の合成試薬は Applied Biosystems (San Francisco, CA) または American Biochemical (Bozerville, CA) より市販入手可能である。ヌクレオシド添加に続き、無水酢酸による末反応 5'-ヒドロキシのキャッピング、沃素添加、およびトリクロロ酢酸一塩化メチレン中での 5'-脱トリル化を行なう。

樹脂配合オリゴマークロロフェニルトリエステルを無水アセトニトリル内で洗粋することにより脱色し、この操作を繰り返す。この方法を用いる通常の周期は13分であり、その純化効率は92%以上である(トリチル放出により判断)。最後の残渣を β -シアノエチルホスホトリエステルとして加えると、残渣の開裂の際に5'-末端ホスホジエステルを生ずる。このステップはオリゴヌクレオチドの放射ラベルおよびゲル電気泳動を用いる生成物の検出を可能にする(Naranga

~~4~~ 1 0

インビトロで及び培養細胞中でのβ-グロビン蛋白質の合成
に対するトリチル末端オリゴヌクレオチドの効果

前行する例において与えられた合成法を用いて、過酸タイプ及びエチルトリエステルタイプの同オリゴヌクレオチドを作製した。分子の5'末端に加水性基を含有する両親水性DNA接合体の最も簡単な例において、合成の終りにトリチル基を置した。このタイプの凝固された物質を、ヘモグロビンを生産する様に飼育されたマウス赤血白血細胞腫でのヘモグロビンの特異的発現の防止におけるそれらの有効性について試験した。これらの及び次の例において試験されたオリゴヌクレオチドを第1表に示す。

第 1 表

細胞培養実験において使用するために合成されたDNA配列

マウスβ-グロブリン遺伝子に結合したオリゴヌクレオチド配列	GC (%)	配列 (3' → 5')
MBG 15 アンチセンス	60%	6 TAC CAC GTG CAC TG
MBG 15 アンチセンス-DNT	60%	6 TAC CAC GTG CAC TG-DNT
MBG 15 アンチセンス-C ₁₀ -アミン	60%	6 TAC CAC GTG CAC TGp-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂
MBG 15 エチルトリエステル	60%	6 lac cac atg aac tg
MBG 15 エチルトリエステル-DNT	60%	6 lac cac atg aac tg-DNT
MBG 20 アンチセンス	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C
MBG 20 アンチセンス-C ₁₀	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂
MBG 20 アンチセンス-C ₁₀ -アミン	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂
MBG 20 アンチセンス-C ₁₀ -FITC	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂ -FITC
MBG 20 アンチセンス-C ₁₀ -FITC	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂ -FITC
MBG 20 アンチセンス-C ₁₀ -FITC	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂ -FITC
MBG 20 アンチセンス-C ₁₀ -FITC	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂ -FITC
MBG 20 アンチセンス-C ₁₀ -FITC	55%	6 TAC CAC GTG CAC TGA CTA C-O-(CH ₂) ₁₀ -NH ₂ -FITC

a) 小文字は、アミノ酸の3文字コードを示す。DNTは、D-ノーストリチルオチドを示す。C₁₀は、10個の炭素原子を持つアルキル基を示す。アミンは、末端にアミノ基(-NH₂)を持つ。FITCは、フルオロレシフェリンイソチオシアレート(分子量3500)を示す。DNTは、D-ノーストリチルオチドを示す。C₁₀は、10個の炭素原子を持つアルキル基を示す。アミンは、末端にアミノ基(-NH₂)を持つ。FITCは、フルオロレシフェリンイソチオシアレート(分子量3500)を示す。

第 2 表

マウス細胞におけるヘモグロビンの蓄積に対するトリチルオリゴマーの効果

オリゴマー濃度 (mM)	生存細胞 (%) (対照に対する%)	ヘモグロビン (g/g B ₂)	阻害 (%) B ₂ 細胞
DMSO 対照	100%	100%	0%
MBG 15 100mM	100%	68%	32%
MBG 15 ETE 50mM	95%	59%	41%
MBG 15 ETE-DNT 50mM	94%	43%	57%

(*) 第1表を参照のこと。ETEはエチルトリエステルである。

例 1.1

培養細胞におけるβ-グロブリン蛋白質の合成に対する異性アルキル末端オリゴヌクレオチドの効果

先行例において与えられた合成法を用いて、5'-末端アミノアルカンに結合した15~20塩基長のオリゴヌクレオチドを例5に記載したようにして作製した。このタイプの精製された物質を、ヘモグロビンを生産するように誘導されたMEL細胞でのヘモグロビンの特異的発現の阻害におけるそれらの有効性について試験した。この結果を第3表に示す。試験方法は例10に示した通りである。

第 3 表

培養細胞でのヘモグロビン合成の阻害におけるオリゴヌクレオチドの有効性に対する疎水性の増加の効果

処 理	生存細胞 (%)	ヘモグロビン (g/g B ₂) 細胞の阻害
DMSO 対照	46%	0%
MBG-20	50%	41%
アンチセンス 50mM	50%	41%
MBG-20-C ₁₀ 50mM	61%	48%
MBG-20-C ₁₀ 50mM	60%	48%
MBG-20-C ₁₀ 50mM	62%	66%

(*) 第1表を参照のこと。

第3表に示すように、得られた結果が示すところによれば、アミノアルカン末端オリゴマーは、末端アルカンを欠くそれらの同族配列に比べて、選択的阻害の程度を生成する上で一層効果的である。例えば、C₁₀誘導体は、ヘモグロビン陽性細胞の数の減少において対照未修飾20マーに比べて約60%多く効果的であった。一般に、アルキル鎖が長くなるに従って、同じ程度(%)の阻害を行うのに必要なオリゴマーの濃度は低くなる。

例 1.2

培養細胞におけるβ-グロブリン蛋白質の合成に対するフルオレシニン末端オリゴヌクレオチドの効果

例1に示した合成法を用いて、リンカーとしてエチレンジアミンを使用して5'-末端フルオレシニンに結合した15~20塩基長のオリゴヌクレオチドを作製した。細胞へのオリ

ゴマーの取り込みを蛍光顕微鏡によりモニターすることができ、このことが生成物による細胞死の他の証拠を提供する点において、この物質はさらなる利点を有する。精製された蛍光オリゴマーを、ヘモグロビンを生産するように誘導された MEL 細胞でのヘモグロビンの特異的発現の阻害におけるそれらの有効性について試験した。結果を第 4 表に示す。

この試験の方法は例 10 に示した通りである。

第 4 表

培養細胞でのヘモグロビン合成の阻害に対する FITC 複合体の効果

オリゴマー ^(*)	生存細胞 (%)	ベンジジン ^(*) 細胞の阻害
DMSO 対照	53%	0%
HBG-20		
アンチセンス 50 μM	73%	35%
HBG-20-C ₁₂ -FITC 50 μM	68%	45%
HBG-20-C ₁₂ -FITC 50 μM	76%	36%
HBG-20-C ₁₂ -FITC 50 μM	72%	52%

^(*) 第 1 表を参照のこと。

第 4 表からわかるように、得られた結果が示すところによれば、フルオレッセイン末端オリゴマーは、ヘモグロビン合成の選択的阻害の生成において、FITC を欠くそれらの同族対照配列と少なくとも同等に効果的である。さらに、処理された細胞の蛍光顕微鏡観察は、フルオレセインが結合したオリゴマーの取り込みに基づく増強された蛍光を示した。次に、これらの細胞を単離し、生理的食塩水中で数回洗浄し、そして水中での数回の凍結・解凍により溶解せしめた。生ずる溶液

第 5 表

培養細胞でのヘモグロビン合成の阻害に対するポリエチレングリコール複合体の効果

オリゴマー複合体 ^(*)	生存細胞 (対照に対する %)	ベンジジン ^(*) 細胞の阻害
DMSO 対照	33%	0%
HBG-15		
アンチセンス 100 μM	50%	25%
HBG-15-C ₁₂ 100 μM	60%	22%
PEG(ss) 100 μM	43%	24%
HBG-20+PEG(ss) 100 μM	43%	78%
DMSO 対照	65%	0%
HBG-20-PEG(ss) 15 μM	0%	95%
5 μM	62%	52%
1 μM	nd	-2%
0.1 μM	64%	-5%

^(*) 第 1 表を参照のこと。

第 5 表に示すように、得られた結果が示すところによれば、ポリエチレングリコールに結合したオリゴマーは所望の程度の選択的阻害の生成において、対照より効果的であった。この例におけるポリエチレングリコール複合体は、20 マー体とポリエチレングリコールとの対照組み合わせよりも約 10 倍活性が高いことが見出された。さらに、PEG 複合体について観察される増加した有効性と一致して、増地へのポリエチレングリコールの単なる添加が、添加された対照アンチセンスオリゴマーの有効性を増加せしめることに注目することは興味深い。

上記の結果から、本発明の新規な複合体が、転写機構を調節する効率の増強において実質的な利点を提供することが明

を達心して細胞破片を除去し、そして存在するフルオレッセイン結合オリゴマーの量をアミンコ (Aminco) 蛍光分光計で定量化した。得られた結果が示すところによれば、処理された細胞は細胞当たり平均 10⁴ 分子のフルオレッセイン結合オリゴマーを同化した。これは、類似の DNA オリゴマー (すなわち溶解性成分を欠く) の細胞当たり約 10⁴ 分子の細胞取り込みに比べて約 10 倍高い。

従って、オリゴマーへの疎水性成分 (この場合フルオレッセイン) の付加が、蛋白質合成を選択的にブロックするその能力に影響を与えることなくオリゴマーの細胞取り込みの実質的増加をもたらすことがわかる。

例 13

培養細胞での β-グロビン蛋白質の合成に対するポリエチレングリコール末端オリゴヌクレオチドの効果

先行例に示した合成法を用いて、5'-末端ポリエチレングリコールに結合した 20 塩基長のオリゴヌクレオチドを、例 4 に記載したようにして作製した。これらの分子複合体を精製し、そして例 10 に記載したようにヘモグロビンの特異的発現の阻害におけるそれらの有効性について試験した。

らかである。この発明に従えば、広範な種類の細胞性 (原核性及び真核性の両方)、並びにウイルス性の、生理的過程が制御され得る。この組成物はインビトロ及びインビボで使用することができる。前者においては、哺乳類のマイコプラズマからの保種、表現型の変更等の機構を研究することができる。後者においては、病原体の増殖阻害、ある種の細胞、例えば B-細胞及び T-細胞の選択的阻害等における療法のために組成物を使用することができる。

この明細書に記載したすべての刊行物及び特許出願はこの発明が属する分野における通常の知識を有するものの技術水準を示すものである。すべての刊行物及び特許出願は、各それぞれの刊行物又は特許出願が引用により組み込まれるべきことが特定して且つ個別的に示されていたのと同様に、引用によりこの明細書に組み込まれる。

前記の発明は理解を明瞭にするために説明により及び例示により幾分詳細に記載されたが添付された詳細の範囲の範囲内において幾かの変換及び変更が行われ得ることは自明であろう。

手続補正書(方式)

平成²年¹¹月⁶日

特許庁長官 吉田 文 毅 殿

1. 事件の表示

PCT/US88/02009

2. 発明の名称

新規な両親媒性核酸換合体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 シンセティック ジェネティクス

4. 代理人

住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目8番10号

野光虎ノ門ビル 電話 504-0721

氏名 弁理士 (8579) 青 木 朗 (外4名)

5. 補正命令の日付

平成1年11月7日(発送日)



国際調査報告

International Application No. PCT/US88/02009

1. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER of source classification symbols only, indicate all:
 Appropriate to International Patent Classification (IPC) or to one of the following: IPC(4): C12N 5/00; C12N 5/03, C12P 19/34
 U.S. 435/242, 435/251

2. FIELD SEARCHES

Classification System **Classification Symbols**

US 435/6, 91, 243 526/27, 28, 29
 530/358

Chemical Abstracts Data Base (CAS) 1967-1988
Keywords: amphiphilic, nucleic acid

3. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Group of Documents	Relevant to Claim No. 1
X	U.S. A. 4,787,441, 12 July 1988, (FUDS ET AL.), see column 1, lines 8-31, and column 2, lines 40-63.	1-19
Y	U.S. A. 4,511,713, 16 April 1985, (MILLER ET AL.), see column 2, lines 13-68, and column 3, lines 1-48.	1-19
Y	U.S. A. 4,587,044 6 May 1986, (MILLER ET AL.), see column 1, line 25 - column 3, line 60.	1-19
Y	FR 2,556,726 21 June 1985 (CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY), page 3, line 23 - page 5, line 4.	1-19
Y	GB, 2,153,256 A, 21 August 1985, (CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY), see page 1, line 125 - page 2, line 47.	1-19

4. CERTIFICATION

Date of the Actual Completion of the International Search: 13 September 1988

Date of Mailing of the International Search Report: 08 NOV 1988

International Searching Authority: STEPHANIE SELIGMAN, Ph.D., J.D.

8. 補正の対象

- (1) 特許法第 184条の 5 第 1 項の規定による書面の「特許出願人の代表者」の欄
- (2) 明細書及び請求の範囲の翻訳文
- (3) 委任状
- (4) 法人証明書

7. 補正の内容

- (1)(3)(4) 別紙の通り
- (2) 明細書、請求の範囲の翻訳文の淨書(内容に変更なし)

8. 添付書類の目録

- (1) 訂正した特許法第 184条の 5 第 1 項の規定による書面 1 通
- (2) 明細書及び請求の範囲の翻訳文 各 1 通
- (3) 委任状及びその翻訳文 各 1 通
- (4) 法人証明書及びその翻訳文 各 1 通

International Application No. PCT/US88/02009

3. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT (CONTINUED FROM THE SECOND SHEET)

Category	Group of Documents	Relevant to Claim No. 1
Y	NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (Oxford, England), Volume 13, Number 7, issued 11 April 1985, (SMITH ET AL.), "Synthesis of oligonucleotides containing an aliphatic amino group at the 5' terminus; synthesis of fluorescent DNA primers for use in DNA sequence analysis", see abstract.	1-19
Y	BIOCHEMISTRY, (Easton, Pennsylvania, U.S.A.), Volume 24, Number 22, issued 22 October 1985, (BLAKE ET AL.), "Inhibition of Rabbit Globin mRNA Translation by Sequence-Specific Oligodeoxyribonucleotides", see pages 6133-6135.	1-19
Y	BIOCHEMISTRY, (Easton, Pennsylvania, U.S.A.), Volume 13, Number 24, issued 19 November 1974, (BARRETT ET AL.), "Inhibitory Effect of Complex Formation with Oligodeoxyribonucleotide Ethyl Phosphotriesters on Transfer Ribonucleic Acid Aminoacylation", see page 4897.	1-19
Y	NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (Oxford, England), Volume 13, Number 5, issued March 1985, (CHOLLET ET AL.), "Biotin-labeled synthetic oligodeoxyribonucleotides: chemical synthesis and use as hybridization probes", see page 1529.	1-19
Y	NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (Oxford, England), Volume 13, Number 12, issued June 1985, (CONNOLLY, J.), "Chemical synthesis of oligonucleotides containing a free sulphhydryl group and subsequent attachment to thiol specific probes", see page 4485.	1-19
Y	NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (Oxford, England), Volume 11, Number 19, issued September 1983, (CEU ET AL.), "Derivatization of unprotected polynucleotides", see page 6313.	1-19
Y	SCIENCE, (Washington, D.C., U.S.A.), Volume 230, issued 18 October 1985, (CARUTHERS), "Gene Synthesis Machines: DNA Chemistry and its Uses", see page 281.	1-19

第1頁の続き

⑤Int. Cl. ⁹	識別記号	庁内整理番号
A 61 K 31/70	ABC	
	ADU	7431-4C
31/76	AEB	
	ADY	
	ADZ	
C 12 N 5/10		
15/87	ZNA	
// A 61 K 48/00		8615-4C